

PROVINCIA DI ROMA

Sulla base della «Carta fitoclimatica del Lazio» la provincia di Roma rientra nei seguenti tipi fitoclimatici:

- tipo 7: Valle del fiume Tevere tra Orte e Monterotondo;
- tipo 8: Zagarolo;
- tipo 9: Campagna romana;
- tipo 11: Colli Albani, regione Tolfetana e Sabatina;

tipo 12: Pomezia, Anzio, Nettuno;

tipo 13: litorale romano;

Acer obtusatum Waldst et Kit. acero d'Ungheria;

Ilex aquifolium L. agrifoglio;

Castanea sativa Miller, castagno;

Quercus cerris L., cerro;

Quercus frainetto Ten., farnetto;

Quercus suber L., sughera;

Quercus ilex L., leccio;

Quercus robur L., farnia;

Carpinus betulus L., carpino bianco;

Laurus nobilis L., alloro;

Sorbus torminalis (L.) Crantz, sorbo torminale;

Nespilus germanica L., nespolo volgare;

Ulmus minor Miller, olmo comune;

Fraxinus oxycarpa Lieb., frassino meridionale;

Salix alba L., salice comune;

Olca olcaster L., olcastro;

~~*Ceratonia siliqua* L., carrubo;~~

Quercus pubescens Willd., roverella;

Sorbus domestica L., sorbo comune;

Arbutus unedo L., corbezzolo;

Ostrya carpinifolia Scop., carpino nero;

Fraxinus ornus L., orniello;

Acer monspessulanum L., acero minore;

Acer campestre L., acero oppio;

Sorbus aria (L.) Crantz, sorbo montano;

Carpinus orientalis Miller, carpino orientale;

Quercus petraea Lieb., rovere;

Fagus sylvatica L., faggio;

Tilia platyphyllos Scop., liglio nostrano;

Sorbus aucuparia L., sorbo degli uccellatori;

Juniperus oxycedrus L., ginepro ossicedro;

Fraxinus ornus L., orniello;

Ulmus minor Miller, olmo comune;